

## 日本脳炎予防接種のお知らせ

日本脳炎の予防接種は、平成17年度から平成21年度にかけて、予防接種による副反応の影響により接種の積極的勧奨が差し控えられていました。このため、接種の機会を逃した方（平成7（1995）年4月2日から平成19（2007）年4月1日生まれの方）は20歳未満の間、特例対象者として無料で接種を受けることができます。該当の方は接種を受けましょう。

特に令和4年度に18歳になる方（平成16年4月2日～平成17年4月1日生まれ）で、第2期の予防接種を受けていない場合は、早めの接種をお勧めします。

日本脳炎とは、ウイルスを媒介するコガタアカイエカに刺されることで感染します。ヒトからヒトに感染しません。症状がでないことやカゼのような症状の場合がありますが、重い症状の場合や後遺症を残すことがある病気です。

予防接種は日本脳炎に対する感染を予防します。

副反応としては、接種部位の腫れ・痛み、全身症状は発熱・だるさなどがみられることがあります。

### 1. 接種方法について

#### 生後6か月（標準的には3歳）～7歳6か月に至るまでの方

標準的な接種年齢は、1期初回は3歳、1期追加は4歳です。接種回数と接種間隔は表のとおりです。

日本脳炎ワクチン		接種間隔	標準的な接種年齢
1期	初回	1回	3歳
		2回	
	追加	2回目から6か月以上（標準的にはおおむね1年）の間隔をあける	4歳

#### 9歳～13歳未満の方

標準的な接種年齢は、2期は9歳で、接種回数は1回です。

### 特例対象者

平成14年4月2日～平成19年4月1日生まれで20歳未満の方

日本脳炎予防接種が20歳の前日までに合計4回になるように接種します。

日本脳炎ワクチン		接種間隔
既に接種した回数	接種回数（合計4回）	
0回	残り4回 1期3回、2期1回	1回目から6日以上（標準的には28日まで）の間隔をあけて2回接種し、6か月以上（標準的にはおおむね1年）の間隔をあけて3回接種します。 4回目（2期接種に相当）の接種は、9歳以上で3回目の接種後6日以上の間隔をあけて接種します。
1回	残り3回 1期2回、2期1回	2回目と3回目は6日以上の間隔をあけて接種します。4回目（2期接種に相当）の接種は、9歳以上で3回目の接種後6日以上の間隔をあけて接種します。
2回	残り2回 1期1回、2期1回	3回目と4回目（2期接種に相当）は6日以上の間隔をあけて接種します。ただし、4回目の接種については9歳以上で接種します。
3回	残り1回 2期1回	4回目（2期接種に相当）の接種を行います。ただし、9歳以上で接種します。

### 平成21年4月2日～平成21年10月1日生まれの方の特例

接種の有無によって接種期間や接種方法が異なります。

接種回数	接種期間	接種方法
1回以上	生後6か月（標準的には3歳）～7歳6か月に至るまで、及び9歳以上13歳未満	・平成14年4月2日～平成19年4月1日生まれの方の接種方法に準ずる。 ・6日以上の間隔をあけて接種 ・4回目（2期）の接種は9歳以上13歳未満に接種
0回	生後6か月（標準的には3歳）～7歳6か月に至るまで、及び9歳以上13歳未満	・1回目から6日以上（標準的には28日まで）の間隔をあけて2回接種し、6か月以上（標準的にはおおむね1年）の間隔をあけて3回接種します。 ・4回目（2期）の接種は9歳以上13歳未満に接種

## 2. 予診票について

母子健康手帳と印鑑を持参のうえ、かすみがうら市保健センターにお越しください。